arXiv:1506.08112v1 [math.CO] 26 Jun 2015

COURTE PREUVE D'UNE IDENTITÉ COMPORTANT LES NOMBRES DE BERNOULLI

par

Abdelmoumène ZEKIRI & Farid BENCHERIF

Résumé. — Dans cet article, nous donnons une courte preuve d'une relation généralisant de nombreuses identités pour les nombres de Bernoulli.

1. Introduction et résultat

Soit $S_x(z) := \frac{ze^{zx}}{e^z-1}$ la série génératrice exponentielle des polynômes $(B_n(x))_{n\geq 0}$ de Bernoulli. La suite $(B_n)_{n\geq 0}$ des nombres de Bernoulli est définie par

$$B_n = B_n(0), \quad (n \geq 0).$$

On a alors

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k x^{n-k}.$$

De nombreux auteurs se sont intéressés à la remarquable identité suivante

$$(-1)^m \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} B_{n+k} - (-1)^n \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_{m+k} = 0. \tag{1}$$

Cette identité posée comme problème par Carlitz [**2**] en 1971 fut prouvée en 1972 par Shanon [**12**] puis par Gessel [**6**] en 2003, par Wu, Sun et Pan [**14**] en 2004, par Vassilev-Missana [**13**] en 2005 et par Chen et Sun [**3**] en 2009. Gould et J. Quaintance [**7**] la prouvent de nouveau en 2014. Enfin Prodinger [**10**] en donne une preuve remarquablement très courte en 2014 par l'emploi d'une série formelle à deux variables. Il est immédiat de

Mots clefs. — Nombres de Bernoulli, Polynômes de Bernoulli.

constater que (1) est un cas particulier, obtenue pour $q = 0$, de la relation suivante établie en 2012 par le second auteur et Garici [**1**]

(2)
$$(-1)^m \sum_{k=0}^{m+q} \binom{m+q}{k} \binom{n+q+k}{q} B_{n+k} - (-1)^{n+q} \sum_{k=0}^{n+q} \binom{n+q}{k} \binom{m+q+k}{q} B_{m+k} = 0.$$

Dans cette note, nous présentons une très courte preuve de la relation (2) qui repose essentiellement sur le fait bien connu que tout polynôme de Bernoulli $B_n(x)$ d'indice n impair s'annule pour $x = \frac{1}{2}$ et qu'on prouve facilement en remarquant que $S_{\frac{1}{2}}(-z) = S_{\frac{1}{2}}(z)$. En considérant alors la forme linéaire L définie sur le $\mathbb{Q}$- espace vectoriel $\mathbb{Q}[x]$ par $L(x^n) = B_n$, pour tout $n \geq 0$, cette propriété se traduit par

$$L\left(\left(x + \frac{1}{2}\right)^{2n+1}\right) = B_{2n+1}\left(\frac{1}{2}\right) = 0 \qquad (n \geq 0).$$

Il suffit alors de remarquer que le polynôme

$$P(x) = (-1)^{m+q} x^{n+q} (1+x)^{m+q} - (-1)^n x^{m+q} (1+x)^{n+q},$$

vérifie la relation

$$P(-\frac{1}{2} + x) + (-1)^q P(-\frac{1}{2} - x) = 0.$$

Il en résulte alors que

$$P^{(q)}(-\frac{1}{2} + x) + P^{(q)}(-\frac{1}{2} - x) = 0.$$

On en déduit que $P^{(q)}(x)$ est un polynôme impair en $x + \frac{1}{2}$ et par conséquent que

$$L\left(P^{(q)}(x)\right) = 0.$$

Ce qui fournit la relation (2) en constatant que

$$\frac{1}{q!} P^{(q)}(x) = (-1)^m \sum_{k=0}^{m} \binom{m+q}{k} \binom{n+q+k}{q} x^{n+k} - (-1)^{n+q} \sum_{k=0}^{n} \binom{n+q}{k} \binom{m+q+k}{q} x^{m+k}.$$

Signalons que la relation (2) généralise de nombreuses identités connues pour les nombres de Bernoulli.

Pour $m = n$ et $q = 1$, la relation permet d'obtenir une relation prouvée par Ettingshausen [**5**] en 1827, redécouverte par Seidel [**11**] en 1877 puis de nouveau par Kaneko [**8**] en 1995 et prouvée aussi par Gessel [**6**] en 2003 ainsi que par Chen et Sun [**3**] et par Cigler [**4**] en 2009.

Pour $q = 1$, on obtient la relation établie par Momiyama [**9**] en 2001, puis prouvée de nouveau par Wu Sun et Pan [**14**] en 2004 et par Chen et sun [**3**] en 2009.

Pour $m = n$ et $q = 3$, on retrouve une relation établie en par Chen et Sun [**3**] en 2009.

Pour $m = n$ et q impair, on retrouve la relation établie par les auteurs [**15**] en 2011.

Références

[1] Bencherif, F. et Garici, T. (2012). Suites de Cesàro et nombres de Bernoulli. Publ. Math. Besançon Algèbr. Théor. Nr, (1), 19-26.

[2] L. Carlitz. Problem 795. *Math. Mag.* **44** (1971), 107.

[3] W. Y. C. Chen, L.H. Sun, Extended Zeilberger's Algorithm for Identities on Bernoulli and Euler Polynomials, *J. Number Theory* 129, (2009) 2111-2132.

[4] J. Cigler, q-Fibonacci polynomials and q-Genocchi numbers arXiv :0908.1219v3 [math.CO] (2009).

[5] von Ettingshausen, A. Vorlesungen über die höhere Mathematik, Bd. 1, Vienna : Carl Gerold, (1827).

[6] I. M. Gessel, Applications of the classical umbral calculus, Algebra Universalis 49 (2003) 397-434, dedicated to the memory of Gian-Carlo Rota.

[7] H. W. Gould and J. Quaintance. Bernoulli numbers and a new binomial transform identity. *J. Integer Sequences* **17** (2014), Article 14.2.2.

[8] M. Kaneko, A recurrence formula for the Bernoulli numbers, Proc. Japan Acad. Ser.A Math. Sci. 71 (8) (1995) 192-193.

[9] H. Momiyama, A new recurrence formula for Bernoulli numbers, Fibonacci Quart. 39(3) (2001) 285-288.

[10] H. Prodinger, A Short Proof of Carlitz's Bernoulli Number Identity, *J. Integer Sequences* **17**.2 (2014), Article 14.4.1.

[11] L. Seidel, Uber eine einfache Entstehungsweise der Bernoullischen Zahlen und einiger verwandten Reihen, Sitzungsber. Münch. Akad. Math. Phys. Classe (1877) 157-187.

[12] A. G. Shannon. Solution of Problem 795. *Math. Mag.* **45** (1972), 55–56.

[13] P. Vassilev and M. Vassilev–Missana. On one remarkable identity involving Bernoulli numbers. *Notes on Number Theory and Discrete Mathematics* **11** (2005), 22–24.

[14] K.-J. Wu, Z.-W. Sun and H. Pan, Some identities for Bernoulli and Euler polynomials, Fibonacci Quart. 42 (2004) 295-299.

[15] Zékiri, A. and Bencherif, F. A new recursion relationship for Bernoulli Numbers. In Annales Mathematicae et Informaticae, Vol. 38, (2011), pp. 123-126).

---

29 juin 2015

Abdelmoumène ZEKIRI, Faculté de Mathémathématiques, U.S.T.H.B., LA3C, Bp 32 El Alia 16111 Bab Ezzouar Alger, Algérie. • *E-mail :* `azekiri@usthb.dz,czekiri@gmail.com`

Farid BENCHERIF, Faculté de Mathémathématiques, U.S.T.H.B., LA3C, Bp 32 El Alia 16111 Bab Ezzouar Alger, Algérie. • *E-mail :* `fbencherif@usthb.dz, fbencherif@yahoo.fr`